

# Casus ALHYDRAN: Tweedegraads brandwond

## 1. Beschrijving casus

leeftijd patiënt	45 jaar
geslacht	man
oorzaak	brandwond door vuurwerk
behandeling voor wondsluiting	Flammazine
therapie nazorg	5 weken na ongeval start met ALHYDRAN: driemaal daags (tijdens de eerste paar weken dik opgebracht)

## 2. Ontwikkeling van de wond



## 3. Conclusies medisch team

- Diepe tweedegraads brandwond met ernstig enkelletsel
- Therapie start met Flammazine, patiënt herstelt goed, alleen veel klachten over jeuk van gesloten huid
- Na 5 weken: start met ALHYDRAN op de pas gesloten wond, 3 maal per dag
- ALHYDRAN heeft een goed effect op de huid die snel verbeterde
- Jeukklachten verdwenen onmiddellijk bij gebruik van ALHYDRAN

## 4. Ervaring van de patiënt

- Flammazine veroorzaakte veel jeukklachten
- Na start van de behandeling met ALHYDRAN, onmiddellijke afname van jeuk
- Therapie: 3x per dag, of elke keer dat de huid jeukte
- Na 6 maanden was de huid zacht en kalm en begon de patiënt weer met sporten
- De huid ziet er nu goed en rustig uit
- Na 18 maanden een onderhoudsdosis van eenmaal daags met ALHYDRAN

Casus: K. Veel MD PhD, AAB Aruba